

# Avertissements agricoles

PUBLICATION PÉRIODIQUE  
ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la D.R.A.F.  
C.C.P. Montpellier 5238-12 G

62M - 7 août 1992

## GRANDES CULTURES SEMENCES N° 10 - LUZERNE

(en collaboration avec la FNAMS et les SUAD de l'Aude, du Gard et de l'Hérault)

### MAÏS - SORGHO

**PYRALE - SESAMIE** : traitement à prévoir entre les 12 et 16 août

**ACARIENS** : présence de petits foyers en bordures, localement. À surveiller

### RIZ

**PYRALE** : traitement à prévoir entre les 10 et 15 août.

## M A Ï S

### PYRALE - SESAMIE

- \* **Stades phénologiques** : en général "brunissement des soies" à début "grain laiteux", mais les parcelles plus tardives sont encore en pleine floraison.
  - \* **Situation** : Pour les 2 espèces, les vols sont actuellement bien installés depuis le début du mois bien que les captures aux différents pièges soient d'un niveau très bas et très variable, mais de nombreuses pontes fraîches ont été observées le 5 août tout particulièrement dans le sud du Gard (Fourques).
  - \* **Stratégie** :
    - 1/ En zones sensibles sésamie-pyrale, et là où les dégâts de 1ère génération ont été significatifs : **Traitez à partir du milieu de la semaine prochaine pour une intervention chimique**
    - 2/ En zones sensibles pyrale seule et devant être protégées aux Thrichogrammes, **intervenir dès réception pour le premier lâcher (renouvellement 8 jours plus tard).**
- spécialités commerciales utilisables : voir dépliant de protection du maïs.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE  
SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

ÉDITION DE LA STATION LANGUEDOC-ROUSSILLON  
Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, place Chaptal  
34076 MONTPELLIER CEDEX / Tél. 67 92 41 42

Nouvelle adresse :  
ZAC D'ALCO - BP 3056  
34034 MONTPELLIER CEDEX 01  
Tél. 67 10 19 50



## **ACARIENS**

Sur quelques parcelles du réseau on observe de petits foyers en bordures (Garons - Servian) où les acariens sont essentiellement présents sur les feuilles de la base, rarement sur celles de l'épi. Très peu de décolorations marquées pour le moment.

En cas de pullulation importante, en extension rapide (favorisée par les fortes chaleurs) ajouter au produit "pyrale-sésamie" (Sauf **TRICHOGRAMMES** ! ....) un acaricide curatif : OMITE 57EL à 2 l/ha, KELTHANE EC à 4 l/ha, TALSTAR à 0,3 l/ha, TALSTAR FLO à 0,375 l/ha.

## **HELIOTHIS**

Présence assez généralisée et quelquefois conséquente (chenilles verdâtres rayées de brun sur la longueur, attaquant l'extrémité des épis).

Le traitement "pyrale-sésamie" assurera la protection.

## **PUCERONS**

Quasiment absents.

# **R I Z**

## **PYRALE**

- \* **Situation** : un premier pic de vol s'est établi fin juillet-début août. Compte tenu de la biologie du ravageur et des conditions de température actuelles, un maximum d'éclosion aura lieu entre les 10 et 15 août.
- \* **Stratégie** : intervenir dans cette période, en zones sensibles et sur variétés sensibles (type KORAL, ARIETE, RIGO, ROCCA,...) sachant qu'avec les produits classiquement utilisés (pyréthrinoides) l'efficacité est optimale sur larves très jeunes, âgées au plus de 7 jours, les rémanences étant le plus souvent de 14 jours au maximum.

**N.B.** : En l'absence de catégorie d'homologation pyrale sur riz ouverte, par assimilation, se référer aux produits homologués sur pyrale du maïs.